

Dra. Diocelina Viruette Pontigo
Patóloga - Citopatóloga

SUCURSALES

Tuxtla

6a norte poniente #720-A
(entre 6a y 7a poniente)
Col. Centro.

✓ 961 611 1755 / 961 600 0093

☎ 961 241 0968

> sedetuxtla@lpalaboratorios.com

San Cristóbal

Calz. Manuel Velasco Suárez
#3 Col. La Isla

✓ 967 116 0827

☎ 967 136 3088

> sedesanctis@lpalaboratorios.com

Villaflores

1a oriente entre 2a y 3a sur
Col. Centro.

✓ 965 652 1905

☎ 965 100 5722

> sedevillaflores@lpalaboratorios.com

Comitán

5a sur oriente #37
esq. Con 4a oriente sur
Barrio San Agustín

✓ 963 688 6319

☎ 963 330 4346

> sedecomitan@lpalaboratorios.com

OFICINA CENTRAL

Avenida Presa Cecilio del Valle 110. Colonia Las Palmas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LPALABORATORIOS.COM

FICHA TÉCNICA

CULTIVO URETRAL

RESPONSABLE SANITARIO Dra. Diocelina Viruette Pontigo - Especialista en Anatomía Patológica
Universidad Nacional Autónoma de México. Recertificada por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos A.C.
Cédula Profesional 3604708 / Cédula de especialidad 4452884

f Instagram LaboratoriosLPA



CULTIVO URETRAL

CULTIVO URETRAL

Examen que se utiliza para identificar microorganismos en la uretra que puedan estar causando alguna infección.



RECOMENDACIONES

- La muestra debe tomarse preferentemente antes de la primera micción de la mañana, si no es posible se deberá esperar al menos dos horas tras la última micción para recogerla.
- Suspender antibióticos 3 días antes de la toma o notificar al personal.
- No tener relaciones sexuales por lo menos 72 hrs antes de la toma.
- No aplicarse ningún gel o medicamento en la zona de los genitales.

CULTIVO URETRAL

1. Te indicarán qué hacer

Utilizar un algodón o gasa estéril para limpiar la abertura de la uretra en la punta del pene.


2. Preparación

Para recoger la muestra, se le pide al paciente que retraiga el prepucio y lo mantenga así durante todo el procedimiento.




3. Tomarán la muestra

Se introducirá en la uretra un hisopo uretral 2-3 cm suavemente con un movimiento de rotación (nunca hisopo convencional). Si el paciente presenta secreción, no será necesario llevar a cabo la introducción del hisopo uretral, la toma se podrá realizar de la secreción con un hisopo convencional.



4. Cultivo Stuart

Colocar el hisopo en el medio de transporte Stuart, verificando que quede bien cerrado.



Nota

Este procedimiento lo debe realizar un personal masculino, para comodidad del paciente y el personal.